

Trochę teorii:

Choroby przenoszone drogą płciową przez kontakt seksualne dopochwowy- tradycyjny stosunek; analny stymulowanie okolic odbytu oraz kontakt oralny drażnienie językiem narządów płciowych partnera. Kontakt oralny, choć może wydawać się bezpieczny, bo nie zachodzi się w ciążę jest niebezpieczny ze względu na zakażenie się chorobami wenerycznymi. Dzielenie się gadżetami erotycznymi również może prowadzić do zakażenia.

Kiła- spowodowana jest przez bakterie. Pierwsze objawy pojawiające się w okresie 3 tygodni od zakażenia, w okolicach narządów płciowych, odbytu lub jamie ustnej, pojawia się owrzodzenie, powiększają się węzły pachwinowe. Samoistnie znika, a po 3-4 miesiącach pojawiają się zmiany skórne.

Rzeżączka- spowodowana przez bakterię, bakteria może powodować objawy w okolicach intymnych, objawy to ropne upławy i pieczenie przy oddawaniu moczu. Powodować może rzeżączkowe zapalenia gardła po seksie oralnym. Ryzykowne jest używanie ręcznika i gąbki, które mogły być używane przez osobą zakażoną, bakteria przeżywa tam od 3-24h.

Chlamydia trachomatis (chlamydia)- jest bakterią powodującą zakażenie dróg moczowo-płciowych, jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Można zarazić się przez kontakty seksualne oraz kontakt z narządami płciowymi zakażonego partnera. W pochwie pojawia się nadżerka, plamka, czerwona o nierównej brodawkowatej powierzchni oraz pieczenie przy oddawaniu moczu oraz częstomocz.

Bakteryjne zapalenie pochwy- nie jest to choroba przenoszona drogą płciową, jednak bardzo często występuje u młodych kobiet o zaburzonym cyklu miesiączkowania, stosujących tampony oraz przy braku dbania o higienę. Pojawia się u osób o obniżonej odporności organizmu. Pojawiają się szarawe upławy, tzw. „rybi zapach” wzmożony podczas okresu.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)- przenoszony drogą płciową, każdy rodzaj kontaktu seksualnego z zakażonym partnerem, ostatnio w badaniach bardzo często wskazywany seks oralny. Są to zmiany brodawkowe występujące w okolicy błon śluzowych, okolicy odbytu oraz układu moczowo-płciowego. W okolicach sromu są to miękkie, brodawkowate grudki, w okolicach pochwy mogą pojawiać się grudki różowe lub brunatne, w okolicach ust pojawiają się brodawki. Zakażenie wirusem zwiększa zachorowalność na raka gardła, krtani i narządów płciowych, zwłaszcza u chłopców którzy nie są szczepieni na HPV.

AIDS- choroba spowodowana przez wirus HIV, do zakażenia dochodzi przez kontakty seksualne oraz krew osoby zakażonej. Sam wirus HIV nie daje objawów, dlatego osoba może nie wiedzieć, że jest zakażona. Pewność mogą dać badania krwi.

Rzęzistkowica- spowodowana przez pierwotniaki, pojawiają się żółto-zielone silne upławy, pieczenie w pochwie, silne parcie na mocz.

Świerzb okolic intymnych- wywołany przez pasożyta, objawy to silne swędzenie w okolicach warg sromowych i wzgórek łonowego.

Wszawica łonowa- na włosach łonowych pojawia się wesz, która powoduje swędzenie w okolicach ud, brzucha, pachwin i genitaliów.